MAPA GEOLÓGICO DO PARANÁ

EDIÇÃO 2006

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

SEIM

SEMA
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

MINEROPAR
MINERAIS DO PARANÁ SA

ITCG
Instituto de Terras Cartografia e Geociências

ZEE-PR
Zoneamento Ecológico Econômico do Estado do Paraná

Escala - 1:650.000

DESCRIÇÃO DAS UNIDADES LITOESTRATIGRÁFICAS

QUATERNÁRIO
HOLOCENO

Aterro - Aterros e modificações antrópicas.

Sedimentos Recentes

Qa4 - Areias marinhas atuais (fundos rasos).

Qha2 - Areias de praias atuais.

Qha - Depósitos de deposição fluvial (aluvões), com areias, siltes, argilas e cascalhos, em canais fluviais, barras e planícies de inundação. Aluvões indiferenciados (areias, argilas e cascalhos).

Qha1 - Aluvões antigos.

Qha2 - Aluvões recentes.

Qhmg - Sedimentos flúvio marinhos, associados à mangue/ate.

Qhmo - Sedimentos argilo-siltico-arenosos , paleoestuarinos.

Qm - Sedimentos marinhos de planícies costeira indiferenciados, com cordões litorâneos.

Qm1 - Sedimentos marinhos de planície costeira indiferenciados, com cordões litorâneos. Fase antiga.

Qm2 - Sedimentos marinhos de planície costeira indiferenciados, com cordões litorâneos. Fase intermediária.

Qm3_1 - Sedimentos marinhos de planície costeira indiferenciados, com cordões litorâneos. Fase intermediária antiga.

Qm3 - Sedimentos marinhos de planície costeira indiferenciados, com cordões litorâneos. Fase atual.

Qlm - Argila, silte e areia, selosa e bioca. Depósitos de colúvio e talus. Depósito de colúvio associados à depósitos de talus, com argila, silte, areias e selosa.

Qhca - Cascalheiras continentais retrabalhadas.

Qt - Depósitos de talus, bioca em matriz argilosa.

Qa - Aluvões atuais dispostos em planícies ao longo das drenagens e em pequenas bacias de inundação. Depósitos sobre esses aluvões, de areias, argilas e cascalhos, depositados homogêneos arenó-argilosos, com intercalações de bancos arenosos.

Qa1 - Aluvões atuais e subatuais dispostos em planícies e terraços ao longo das drenagens e em pequenas bacias de inundação. Depósitos, predominando depósitos areno-argilosos, com intercalações de bancos arenosos.

Qal - Aluvões recentes recobrindo planícies de inundação marginais aos rios, constituídos por areias, cascalhos, siltes, argilas e mesmo turfas ricas em arenosos, dependendo da situação em um sistema meandrante.

Qa4+TQI - Qal: Aluvões recentes recobrindo planícies de inundação marginais aos rios, constituídos por areias, cascalhos, siltes, argilas e mesmo turfas ricas em arenosos, dependendo da situação em um sistema meandrante. Sob aluvões em terraços (depósitos acima de 5 metros) em relação ao leito atual das drenagens. Depósitos sedimentares inconsolidados. Colúvios, pretos a areno-argilosos derivados dos Arenitos Caiuá e Santo Anastácio, dispostos sobre esgotões ou em encostas suaves, estando porém assinalados no mapa somente as ocorrências destes colúvios situados diretamente sobre o embasamento basáltico.

Qm - Depósitos eluvionares indiferenciados.

Qt4 - Aluvões recentes recobrindo planícies de inundação marginais aos rios, constituídos por areias, cascalhos, siltes, argilas e mesmo turfas ricas em arenosos, dependendo da situação em um sistema meandrante. Indiferenciado.

QUATERNÁRIO
PLEISTOCENO

Formação Guabirotuba

QPg - Argila, arcósios, areias e cascalhos.

TERCIÁRIO
MIOCENO

Formação Alexandra

Ta - Conglomerados, arcósios, areias e argilitos.

Ta1 - Sedimentos areno argilosos estratificados.

TQI - Sedimentos inconsolidados ou pouco/mente consolidados, com estruturas sedimentares representadas por acamamentos alternados de siltitos e arenitos finíssimos, de cores claras, com intercalações frequentes de camadas de argilas e de níveis de concreções carbonáticas. Depósitos sedimentares inconsolidados, com estratificação plano paralela demarcada por lâminas milimétricas de diferentes camadas. Subordinadamente constitui-se de siltitos arenosos, de cores claras, com intercalações frequentes de camadas de argilas e de níveis de quartzitos, medindo-se entre 5 até centímetros, com colocação cíclica estratigráfica. Orientação Ferrugínea).

TQ2 - Sedimentos inconsolidados ou parcialmente consolidados, com estruturas sedimentares representadas por acamamentos alternados de siltitos e arenitos finíssimos, de cores claras, com intercalações frequentes de camadas de argilas e de níveis de concreções carbonáticas. Depósitos sedimentares inconsolidados, com estratificação plano paralela incipientes e predominantemente estratificações cruzadas de pequeno e médio porte, orientados com dois sitos.

TQ3 - Mais antigos em relação à TQ2.

TQ01 - Mais antigos em relação à TQ.

MESOZÓICO

Grupo Bauru

Ks - FORMAÇÃO ADAMANTINA - Depósitos sedimentares continentais fluviais, constituídos predominantemente por arenitos finos a médios, subordinadamente conglomeráticos, de coloração creme com estratificação plano paralela demarcada por lâminas milimétricas de diferentes camadas. Subordinadamente constitui-se de siltitos arenosos, de cores claras, com intercalações frequentes de camadas de argilas e de níveis de quartzitos, medindo-se entre 5 até centímetros, com colocação cíclica estratigráfica. Orientação Ferrugínea).

Kag - FORMAÇÃO AMANTICADO - Arenitos predominantemente finos a médios com percentagens variadas de siltito bem arredondados, medianamente a mal selecionados, com pouca matriz argilosa. Apresentam tabulações cataclinais e opacos, com estratificações cruzadas tangenciais de médio porte.

Ks - FORMAÇÃO CAIUÁ - Depósitos sedimentares continentais constituídos predominantemente por arenitos finos a médios, subordinadamente conglomeráticos, com teritigelo, caloedônia e opacos, com tendência para apresentar termos mais finos na porção inferior do pacote. A maior parte das áreas de ocorrência do Arenito Caiuá apresenta-se coberto por solos espessos (latossolos acima de metros) de coloração arenosa e avermelhada, originados de rochas subjacentes.

Kcd - Depósito fluviais constituídos por arenitos finos quartzosos, com intercalações de siltitos e arenitos muito finos, com estratificação plano paralelada incipientes e localmente apresentando estratificações cruzadas de pequeno e médio porte, cimentados com silica.

Intrusivas Alcalinas

JKsq - Sienitos, do Complexo alcalino do Banhadão - nefelina cianitos, tinitos, malignitos, ijolitos, essexitos e afins (K - Ar - 68 Ma.)

JKf - Fonolitos, traquitos e nefelina sienitos.

Kj - Maciço alcalino de Tunas - sienito alcalino (predominante) na porção externa dos estruturas anelares. Na parte interna há galerias de filiação alcalina, diortos e quartzo sienitos, além de brechas e rochas vulcânicas. Ocorrências de kimberlitos e basaltos ocilam as rochas do maciço, com textiras brechas magnéticas.

JKf - Complexo gabróico do Bairro da Cruz, constituído predominantemente de fonolito e cromo-gabro.

JKgf - Gabros Joaz Fernandes.

Grupo São Bento

Jsb - Formação de basalto. Entre dois derrames consecutivos, geralmente há intercalações de material sedimentar- arenitos e siltitos- ditos intratrapeanos. Representados por basalto amigdaloidal de base, basalto compacto, basalto amigdaloidal, basalto vesicular e brecha basaltica e/ou sedimentar.

JKsg - Sobrea diabásio

Pmp - Lavas ácidas e intermediárias.

JKsb - Diques básicos em geral, incluindo basaltos, diabasios, gabros e diortos

JKsd - Diques de diabásio e diorito.

JKi - Corpos de arenito intertrapp.

JKi - Formação Botucatu - Arenitos avilicos visco-avermelhados, com topica estratificação cruzada tabular de grande porte. Apresentam alternâncias de lâminas com granulação média a fina, com boa seleção em cada lâmina e grãos bem arredondados em arrabas de fugões. Frequentemente apresentam-se silicificados.

Tp - Formação Piramboia - Arenitos de granulação muito fina a grossera, rivais conglomeráticos, esbranquiçados ou rosados. Níveis de argilito (lentic).

PERMIANO-DEVONIANO

Grupo Passa Dois

Pm - Formação Rio do Rasto - Siltitos e argilitos intercalados de arenitos finos, cores avermelhadas e arroxeadas, mais ocasionais de calcário e silex.

Pt - Formação Teresina - Alternância de argilito, folhelhos e siltitos de cor cinza medio rivanderado, frequentes níveis de silex e calcários extravasiqueiros.

Pi - Formação Irati - Folhelhos pretos betuminosos, cinza escuro a avermelado.

Pi - Formação Irati - Argilitos e folhelhos pretos betuminosos, cinza escuro a preto, intercalações de lentes de calcário cinza claro.

Pi+Psa - Formação Irati: argilitos e folhelhos pretobetuminosos, cinza escuro a preto, intercalações de lentes de calcário cinza claro. Formação Serra Alta: Lamitos e folhelhos cinza escuro a preto.

Pi+Ps - Formação Rio do Rasto: Siltitos e argilitos intercalados de arenitos finos, cores avermelhadas, avermelhadas e arroxeadas, mais ocasionais de calcário e silex. Formação Irati: Argilitos e folhelhos pretos betuminosos, cinza escuro a preto, avermelhados e avermelhados, ocasionais rivais de arenito cinza médio, laminações paralelas inclinadas, lenticulares, convolutas. Calcolitos com fósmeas argilosas.

Psa - Formação Serra Alta - Folhelhos cinza escuro a avermelhados, com intercalações de arenosidas, rivais de calcários, de silex e de coquinas. (Membro Sarnha).

Ping - Formação Rio do Rasto - Argilitos e siltitos avermelhados com intercalações de arenitos finos a médios, de granulação cuzada arenosas, laminações cruzadas e paralelas. (Membro Morro Pelado).

Grupo Guatá

Ig - Formação Palermo - Siltitos cinzentos, predominantemente bioturbados e homogeneizados.

Ir - Formação Rio Bonito - Porção basal arenosa (Membro Triunfo) e porção superior de siltitos esverdeados (Membro Paraguaçu).

Pi3+Pj - Formação Rio Bonito: Arenitos siltitos e folhelhos cinzas, esverdeados e marrons, intercalações de níveis de calcários, cinza claro; laminação paralela, ondulada, truidada e inclinada. Níveis oceânicos de conglomerados e camadas de carvão. Formação Palermo: Siltitos cinzentos, predominantemente bioturbados e laminações rivais.

Pi2 - Formação Rio Bonito: Arenitos siltitos e folhelhos cinzas, esverdeados e marrons, intercalações de níveis de calcários, cinza claro; laminação paralela, ondulada, truidada e inclinada. Níveis oceânicos de conglomerados e camadas de carvão.

Grupo Itararé

Pi - Formação Mafra - Arenitos finos a médios, com estratificação cruzada tangencial de médio porte, com intercalações de siltitos e arenitos finíssimos laminados e bioturbados. Nos mis principais, geralmente são recobertos por arenitos finos a médios, com estratificação cruzada tangencial de médio porte, com camadas (desde alguns metros até dezenas superiores a uma dezena de metros) em relação ao leito atual das drenagens.

TQ2 - Mais antigos em relação à TQ01.

TQ01 - Mais antigos em relação à TQI.

PROTEROZÓICO SUPERIOR

Suite Monzo Granitos e Granodioritos Porfiróides

PSgr1 - Granito Três Córregos.

PSg2 - Granito Guimaranzinga.

PSgMm - Domínio petrográfico Biscaia- Boa Vista: hornblenda biita monzogranitos porfiróides (SH-10) e riolitos (SH-11) e riodacitos (SH-12).

PSgS - Sistema indiferenciados (áreas sem afloramento ou sem controle de campo)

PSgAap - Domínio petrográfico Arroio das Pedrinhas: biotita monzogranitos a hornblenda biotita monzogranitos cinzentos (M 5-15) e rarra muscovita biotita granitoides porfiróides rosados (M-10).

PSgDes - Domínio Petrográfico Espigão Alto: hornblenda biotita monzogranitos inequigranulares cinzentos (M-10).

PSgDeb - Domínio petrográfico Espinilho Branco: biotita granitoides avermelhados (M-10) e granitoides porfiróides rosados (M-10).

PSgDp - Domínio Petrográfico Jotuba Planalto: Hornblenda biotita monzogranitos a granodioritos cinzentos (M 10-20), maiczis ou foliados, fortemente porfiróticos

PSgDpf - Domínio Petrográfico Pinhal Fino: Hornblenda biotita monzogranitos porfiróides, cinza claro a cinza escuro, muscovita biotita granitos claros (M 5-15), estruturar e texturalmente variados, rarra hornblenda biotita monzogranitos a granodioritos cinzentos foliados (M 10-20), além de quartzitos e quartzo muscovita biotita granitos.

PSgDcm - Domínio petrográfico Ouro Verde- Patrimônio Santo Antônio: biotita monzogranitos porfiróides, cinza claro, inequigranulares médios (M-10) com a subporfiróides. 5 cms.

PSgDps - Domínio petrográfico Paredão da Santa: biotita monzogranitos porfiróides, cinza claro (M-10).

PSgDsa1 - Domínio Petrográfico Serra Abalos- Alagados: Hornblenda biotita granodioritos a monzogranitos cinzentos (M10-20) equigranulares ou fortemente porfiróticos (M-10) e riolitos (SH-11).

PSgDsa - Domínio Petrográfico Serra Abalos- Alagados: Hornblenda biotita granodioritos a monzogranitos cinzentos (M10-20).

PSgDsc1 - Granito Serra do Cabambuí: biotita alcali- feldspato granito avermelhados cinza de cor M=10, equigranulares finos a grossos, fluorita como acessório.

PSgDsc - Granito Serra do Cabambuí: biotita granitos avermelhados, porfiróides alterados, (M 5-10), equigranulares a porfiróticos.

PSgDse - Domínio petrográfico Serra Rio: biitita monzogranitos foliados, inequigranulares médios a grossos, cinzentos (M-10) e riolitos (SH-11).

PSgDv - Domínio Petrográfico Varginha: Biotita granitos porfiróticos cinza-claros a esbranquiçados (M5-10).

PSgDvf - Domínio Petrográfico Francisco Sirtes: Muscovita biotita (clorita) sienc a monzogranitos equigranulares médios, M=5, localmente com veios pegmatóides ou com muscovita.

PSgJ - Granito Morro Agudo Joaquim Murtinho: hematita alcali feldspato granitos (rarra sienitos) cinzentos-avermelhados (M =10), equigranulares finos a grossos, caloc/ablásticos, fluorita como acessório.

PSgPa - Domínio petrográfico Paseo da Anta- Água Clara: (muscovita biotita cloritz granito à granodioritos cinzentos (M=5) a riolacs (M=1-2) equigranulares finos e médios.

PSgPf - Domínio petrográfico Pirai do Sul: hornblenda biotita monzogranito a biotita hornblenda diortos inequigranulares a equigranulares médios cinzentos (M 10-15).

PSgZsd - Granito São Domingos: biotita granitos alterados (.7-10), localmente riolacs, com veios de quartzo, sulfetos e/ou fluorita.

PSgZp - Granito Serra do Jacupé: Biotita monzo granitos a granodioritos cinzentos porfiróticos (M 5-10).

PSgZvh - Domínio Petrográfico Vila Branca.

PSgvaau - Domínio petrográfico Abaçaí- Santa Quiterie: hornblenda biotita granodioritos a monzogranitos cinzentos (M 7-20), levemente foliados, inequigranulares a porfiróticos (hexadrilas).

Metabasitos

Anmb - Metabasitos, anfibolitos e anfibólio xistos.

GRUPO AÇUNGUI

Formação Antinha

PSaa1 - Metasiltitos rítmicos, cinza claro a escuro, localmente macicos.

PSaa2 - Metasiltitos intercalados com metasiltitos nodulosos, de cor cinza, associados a metarenitos finos a conglomerados e metarenitos finos, estromatolíticos.

PSaa3 - Metarenitos médios a finos, homfelsados.

PSaaM - Metarrítmitos pirlitosos.

PSadB - Metarrítmitos silicificados, metacarbonitos finos a microconglomerados, esverdeados, com níveis e/ou camadas de metaconglomerados.

PSaaC - Metacalcários calcíticos cinza claro e escuro.

Formação Votuverava

PSav - Metassedimentos silico-argilosos, incluindo metassiltitos, micaxistos, filitos grafitosos, metarrítmitos, ardosias, xenolcta xistos, quartzo xistos, com intercalações de lentes e tufos básicos metamorfisados.

PSan - Metarenitos impuros, metacalcários calcíticos, filitos e metassedimentos clásticos não diferenciados.

PSav2 - Metassiltitos carbonáticos, xistosos, cor verde escuro, com bandas mais claras, granulação fina a média.

PSav3 - Metacalcários calcíticos, metadolomitos e rochas calcissilicatadas

PSavC - Metacalcários calcíticos cinza claro a escuro, intercalados com material impuro.

PSavcM - Metacalcários calcíticos rítmicos, acharoitados com intercalações de metapelitos.

PSavcS - Metassedimentos silico-argilosos, com intercalações frequentes de calcissilicatos e calcário xistos.

PSavM - Metassiltitos, xistos finos micáceos, metarenitos e metariolacs, com frequentes intercalações de metacalcários e metarrítmitos.

PSavr1 - Quartzitos macicos, brancos, puros, finaiás, de granulação fina aspecto sacaroidal, com raras intercalações.

PSavq - Metaconglomerados.

PSavF - Filitos e xistos.

PSvgp - Metagranulitos com raros elipsoides alinhados segundo a xistosidade, quartzo azulado, imersos em matriz clorítica de granulação fina a média.

PSavx - Intercalações de estaurolita-muscovita-biotita xistos e micaxistos.

Formação Itaiacoca

PSam - Metassedimentos silico-argilosos, incluindo metarrítmicos, ardosias e quartzo-xenolita xistos.

PSaC - Metarrítmitos dolomíticos e metadolomitos, com intercalações de metacharts e metacalcários calcíticos.

PSax - Migmatitos estromáticos de paleossoma de mica xisto predominantes.

PSeq - Quartzitos.

PSas - Metacalcários.

PSasn - Anfibolitos para e/ou orto derivados.

PSamx - Metaxistos e metaconglomerados.

PSamb - Metabásicas.

PSan - Filitos de origem vulcânica.

PSaz - Rochas metamórficas diversas (xistos, metassiltitos, rarra metadolomitos, etc.)

Formação Capiru

PSacn - Metassedimentos silico-argilosos, incluindo metassiltitos, filitos, filitos grafitosos, metarrítmitos, ardosias, xenolcta xistos, quartzo-xenolita xistos.

PSacD - Metarrítmitos dolomíticos e metadolomitos com finas intercalações de metacalcários calcíticos.

PSacq - Quartzitos, metarenitos e metaconas.

PROTEROZÓICO MÉDIO

GRUPO SETUVA

Formação Água Clara

PMaxx - Fácies vulcano-sedimentar (São Silvestre): quartzo-mica xistos (Biotita, clorita, muscovita), quartzitos, metariolitos, metarenitos impuros, metadiabasitos, metabulitos básicos, metabasitos e xistos manganesíferos.

PMaxv - Quartzitos cinza-esbranquiçados, cataclasa e com fluxgrafia e/ou epidoto.

PMaxc - Fácies carbonático (Serrinha): cálcio xistos (clorita, biotita, fluxgrafia, epidoto, granada), mármore, actinolito, mármores puros e impuros e micaxistos.

Formação Perna

PMapx - Quartzo-biotita-muscovita xistos e sericita xistos, com intercalações de xistos com plagioclásio, granada e anfibolio.

PMapY - Xistos kerrgenos de cores escuras, com intercalações de cálcio xistos, quartzitos, metariolitos e metabasitos.

PMapQ - Biotita-sericita xistos, clorita-sericita xistos, clorita-biotita-sericita xistos e cálcio xistos.

PMapG - Biotita xistos, anfibolio xistos, quartzo xistos e sericita xistos grafitosos, com intercalações de quartzitos.

PMapC - Metacalcários calcíticos, metadolomitos e cálcio xistos

PMapC1 - Mármores calcíticos silicosos de cor cinza a preta com bandamento e/ou nodulação de sílex, com finas intercalações de metacherts, xistosos, e cálcio xistos e biotita-cálcio xistos.

PMapC2 - Metacalcários calcíticos e rochas calcissilicatadas de cor cinza escuro a esverdeado.

PMapL - Quartzitos finos equigranulares, brancos laqueados ou xistosos, por vezes micáceos.

PMapQ - Quartzitos puros, quartzitos micáceos e quartzo xistos, com frequentes impregnações de basto de ferro, de granulometria média a fina, mal selecionadas.

PMapQ1 - Quartzitos de granulação fina, bem recristalizados, normalmente de coloração clara, estrutura maciça, textura granoblástica e equigranular, podendo conter uma pequena mistura ou apresentando bolsões de quartzo remobilizado.

Complexo Turvo Cajati

PMfc - Granada-estaurolita-biotita-quartzo xisto, actinolita-biotita xistos afoliadoss, com intercalações de quartzitos micáceos, muscovita-biotita-quartzo xistos, anfibolitos, quartzo grosseo subordinados.

ARQUEANO - PROTEROZÓICO INFERIOR

Complexo Granítico-Gnáissico

APAg1 - Parte Branca de Rebequera: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares

APAg2 - Monzogranitos: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares

APAg3 - Miringuava ou São José dos Pinhais: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares

APAgf - Área Branca: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares

APAgN - Nagipó: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares

APAgN1 - Nagipó Sul: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares

APAgR - Granito Serra Canavieira: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares.

APAgS - Quitandinha: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares

APAgSV - Serra da Boiça: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares

APAgT1 - Granito Tagaçaba: Monzogranitos e granodioritos gnáissicos, porfiróides e equigranulares.

Complexo Gnáissico-Migmatítico

APgr - Noritos, anderitos, charno enderitos, gnaisses, meta-quartzo dioritos, metagabros, metadiabasios, metaultramafitos, anfibolitos e rochas calcissilicatadas.

APPmgn - Migmatitos homogêneos com estruturas do tipo schlieren e/ou quartzo-feldspáticas associadas a migmatitos "bent de cheval", localmente pegmatitos e apli-granitos.

APPmgm - Migmatitos estromáticos, com paleossoma de biotita gnaisse, hornblenda gnaisse e hornblenda-biotita gnaisse, localmente com quartzitos.

APPmgx - Migmatitos estromáticos, com paleossoma de metabasito, incluindo biotita-anfibolito bandado e biotita anfibolito gnaisse.

APPmgg - Migmatitos homogêneos constituídos por rochas de granulação grosse.

APPmgn - Migmatitos homogêneos com paleossoma de biotita gnaisse, localmente com quartzitos.

APPmgm - Migmatitos estromáticos, com paleossoma de biotita gnaisse, hornblenda gnaisse e hornblenda-biotita gnaisse, localmente com quartzitos.

APPmgx - Migmatitos estromáticos, com paleossoma de metabasito, incluindo biotita-anfibolito bandado e biotita anfibolito gnaisse.

APPmgg - Migmatitos homogêneos constituídos por rochas de granulação grosse.

APPmgn - Migmatitos homogêneos com paleossoma de biotita gnaisse, localmente com quartzitos.

APPmgm - Migmatitos estromáticos, com paleossoma de biotita gnaisse, hornblenda gnaisse e hornblenda-biotita gnaisse, localmente com quartzitos.

APPmgx - Migmatitos estromáticos, com paleossoma de metabasito, incluindo biotita-anfibolito bandado e biotita anfibolito gnaisse.

Complexo Cachoeira

APPxmq - Migmatitos estromáticos, com paleossoma de metabasito, incluindo biotita-anfibolito bandado e biotita anfibolito gnaisse.

APPxq - Muscovita-biotita quartzitos, fuchsita quartzitos, quartzo xistos, metarenitos impuros, localmente com intercalações de magnetita-mica quartzo xistos, micas quartzo xistos e metaconas.

APPcxx - Anfibolitos, metabasitos e metaultramafitos, hornblenda gnaisses diferenciados.

APPcxm - Xistos magnesianos, anfibolitos, metabasitos, metaultramafitos, gnaisses diferenciados e metaconglomerados.

APPcgm - Gnaisses facies dominantes, xistos feldspáticos com gradação para migmatitos e metaconglomerados.

APPcxh - Anfibolitos e anfibolitos gnaisses.

APPmv - Quartzitos indivisos.

APPcnf - Monzogranitos leucocráticos e provável metavulcânica félsica recristalizada.

Complexo Serra Negra

APNe - Enderbitos, Opdalitos, granulitos gnaissicos, charnockitos, granulo gnaissicos- biotita gnaisses, biotita gnaisses, kinzigitos, diortitos, tonalitos e granodioritos gnaissicos indiferenciados, retromalamorfizados e localmente migmatizados.

PROTEROZÓICO INDIVISO

Complexo Máfico Ultramáfico de Piên

PIEgabro - Metapiroxenitos, metapiroxenitos, metanoritos.

PIChmega - Hornblenda metagabros, hornblendinitos, anfibolitos e hornblenda gnaisses.

PIDx - Talco xistos.

CONVENÇÕES

Topográficas:

- Estrada de Ferro
- Estrada Principal
- Estrada Secundária
- Prefixo de Estrada Federal
- Prefixo de Estrada Estadual
- Hidrografia
- Represa, Rio, Lago
- Ponto
- Aeroporto; Campo de Pouso
- Perímetro Urbano
- Limite Estadual
- Limite Internacional

Estruturas Geológicas:

- Contato Definido
- Contato Encoberto
- Contato Aproximado Provável
- Contato Suposto
- Contato Encoberto
- Contato Inferido
- Contato Inferido de Ajuste
- Contato Litológico
- Contato Tectônico
- Contato Entre Conjuntos
- Limite Intercâmbio
- Contato Interderrames Definido
- Contato Interderrames Provável
- Contato Interderrames Suposto
- Contato Intracorjuntos
- Contato Intracorjuntos e/ou Litológico
- Limite Litológico
- Limite Litológico Suposto
- Lineamento Fotogeológico
- Lineamentos Estruturais
- Quebra de Relevo
- Zona Cataclase
- Atitudes
- Cordão Litorâneo
- Dique
- Dobras (Sinformes, Antiformes)
- Dobras com Flanco Invertido
- Dobras com Indicação de Caimento do Eixo
- Esboço de contorno de Pediplanos ou Peneplanos Antigos
- Falha Definida
- Falha Cavalgamento
- Falha Cavalgamento Provável
- Falha Aproximada
- Falha Encoberta
- Falha Inferida
- Falha Inversa
- Falha Normal

Estruturas Geológicas (Continuação):

- Falha Preenchida por Dique
- Falha Sin-Posterior
- Falha Suposta
- Falha Transcorrente
- Falha Transcorrente Aproximada
- Fratura
- Fratura Suposta e/ou Fotointerpretada

CARTOGRAFIA GEOLÓGICA CONSULTADA



CEGPSPT - 1980 - Escala 1:50.000
CPRM - 1994 - Escala 1:100.000
HIDROSERVICE - 1980 - Escala 1:100.000
IPT - 1981 - Escala 1:100.000
MINEROPAR - 1999 - Escala 1:50.000
ENCKOWN - 1981 - Escala 1:100.000
THENNIS - 1981 - Escala 1:100.000

CPRM - Escala 1:100.000
PETROBRAS - Escala 1:100.000

ARCANJO/ROSA - A.M. & LOPES, R da C. - Projeto Bonita Leste da Bacia do Paraná: Integração geológica e avaliação econômica. - Relatório Final. 1990
ARCANJO, A.M. & SOARES, P.C. - Domínio de sedimentação do Grupo Itararé no Estado do Paraná. - Escala 1:250.000 e 1:100.000.
BARBOSA, O. et al. - Projeto Rocha Metamorfizadas e de Previsão de Recursos Minerais (Folha Ponta Grossa). 1967. escala 1:250.000
BARBOSA, O. et al. - Projeto Rocha Metamorfizadas e de Previsão de Recursos Minerais (Folha Ponta Grossa). 1967. escala 1:250.000
BIGARELLA, J.J. et al. - Projeto Geológico da Folha de Guaratuba. 1969. escala 1:100.000
BIGARELLA, J.J. et al. - Projeto Geológico da Folha de Guaratuba. 1969. escala 1:100.000
BIGARELLA, J.J. et al. - Projeto Leste do Paraná (Folha Campo Largo). 1977. escala 1:100.000
BIGARELLA, J.J. et al. - Projeto Leste do Paraná (Folha Curitiba). 1977. escala 1:100.000
BIGARELLA, J.J. et al. - Projeto Rocha Metamorfizadas e de Previsão de Recursos Minerais (Folha Ponta Grossa). 1967. escala 1:250.000
BIGARELLA, J.J. et al. - Projeto Serra do Mar Sul - Levantamento Geológico. 1979