



**TABELA DE TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE –
MEDICAMENTOS**

Anexo III TRI
Rev. 07
Página 1 de 8

Principais Medicamentos e sua correlação com a Doação de Sangue (continua)

Medicamento	Classificação	Tempo de Inaptidão
Acetato de Dexametasona	Corticóide tópico	Só contraindica a doação se a doença de base o fizer
Acetato de Gosserelina	Controle de câncer prostático passível de manipulação hormonal; · controle da endometriose	Para endometriose ou estímulo no crescimento pode doar
Ácido Acetilsalicílico	Antiagregante plaquetário	Apto doação. Não fracionar plaquetas 3 dias.
Acitretina	Análogo Tretinoína/ Teratogênico	3 anos após interrupção do tratamento
Adalimumabe	Anticorpo monoclonal/ Imunobiológico	Inapto durante uso, avaliar motivo de uso, solicitar carta de médico assistente
Albendazol	Antiparasitário	Apto
Alopurinol	Profilaxia de crises de gota e outras condições associadas com o excesso de ácido úrico	Apto de não estiver em crise. Suspende por 48 horas
Amiodarona	Antiarrítmico	Inapto durante uso, avaliar motivo de uso
Amitriptilina	Antidepressivo tricíclico	Apto
Amoxicilina	Antibiótico	14 dias após término
Aripiprazol	Antipsicótico atípico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Atenolol	Beta bloqueador	48 horas após suspensão
Atorvastatina	Estatina	Apto se níveis de colesterol controlados
Bensilato de anlodipino	Antihipertensivo	Apto doação
Betaistina	Usado para controle da Síndrome vestibular periférica	30 dias após a crise e sem uso de medicamento
Bezafibrato	Anticolesterolinêmicos	Apto doação
Bupropiona	Antidepressivo	Apto doação
Cabergolina	Inibidor da produção de prolactina	Para insuficiência adrenal é inaptidão definitiva
Candesartana cilexetila	Antihipertensivo	Apto
Captopril	Inibidores da ECA	Apto doação
Carbamazepina	Antiepilético / para transtorno de humor	3 anos sem medicamento e sem crise de epilepsia. Para outras indicações, 7 dias de suspensão

MA TRI

“Este documento tem validade somente no Sistema Documentador.

A cópia impressa é considerada não controlada.”



**TABELA DE TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE –
MEDICAMENTOS**

Anexo III TRI
Rev. 07
Página 2 de 8

Principais Medicamentos e sua correlação com a Doação de Sangue (continuação)

Medicamento	Classificação	Tempo de Inaptidão
Carbonato de lítio	Estabilizador de humor	30 dias após suspensão pelo médico assistente
Cetirizina	Antialérgico	Apto 7 dias pós a última dose
Cetoconazol	Antifúngico	7 dias após término
Clofibrato	Anticolesterolinêmicos	Não contraindicam a doação a menos que estejam sendo usados para tratamento de hiperlipidemia familiar
Clomifeno	Para infertilidade feminina; estimula produção de testosterona	7 dias após suspensão
Clonazepam	Ansiolítico/ sonífero	Apto
Clonidina	Antihipertensivo de ação central	48 horas após suspensão
Clopidogrel	Antiplaquetário	14 dias após suspensão, avaliar motivo de uso
Cloridrato de lurasidona	Antipsicótico atípico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Cloridrato de mebeverina	Antiespasmódico	Se para síndrome do intestino Irritável, apto
Cloridrato de metilfenidato	Estimulante do SNC	48 horas após suspensão
Cloridrato de oxibutinina	Para alívio de sintomas urológicos relacionados com a micção	Doador apto
Cloridrato de trazodona	Antidepressivo	Doador apto
Clorpromazina	Antipsicótico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Cloroquina	Para doença autoimune, malária ou outro	Avaliar indicação do uso
Clozapina	Antipsicótico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Colchicina	Anti-inflamatório alcalóide/ Teratogênico	7 dias após suspensão
Danazol	Androgênico fraco, antiestrogênio	6 meses após suspensão
Denosumabe	Anticorpo monoclonal	Para neoplasia (mieloma múltipla) - inaptidão definitiva. Para osteoporose 6 meses após suspensão

MA TRI

“Este documento tem validade somente no Sistema Documentador.

A cópia impressa é considerada não controlada.”



**TABELA DE TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE –
MEDICAMENTOS**

Anexo III TRI
Rev. 07
Página 3 de 8

Principais Medicamentos e sua correlação com a Doação de Sangue (continuação)

Medicamento	Classificação	Tempo de Inaptidão
Desloratadina	Antialérgicos	Apto 7 dias pós a última dose
Diclofenaco	Anti-inflamatório	Apto doação. Não fracionar plaquetas 3 dias
Desidroepiandrosterona (DHEA)	Precursor da testosterona	Se for para menopausa, suspender por 6 meses
Dexclorfeniramina	Antialérgicos	Apto 7 dias pós a última dose
Diazepam	Benzodiazepínico ansiolítico e anticonvulsivante	Apto
Dipiridamol	Antiplaquetário	14 dias após suspensão, avaliar motivo de uso
Dipirona sódica	Analgésico/Antitérmico	Apto; se febre, investigar a causa; de origem não determinada e curta duração, inaptar por 7 dias
Dipropionato de beclometasona	Corticóide tópico	Só contraindica a doação se a doença de base o fizer
Diprospan	Corticóide injetável	Aplicações intra - articulares, inaptar por 15 dias. Se IM, 48 horas
Doxazosina	Alfa bloqueador na HPB	48 horas após suspensão
Dutasterida	Inibidor da 5alfa redutase na HPB/ Teratogêncio	6 meses após a suspensão
Etretionato	Retinóide sintético / Teratogêncio	Inaptidão definitiva
Enalapril	Inibidor da ECA	Apto doação
Fenilbutazona	Anti-inflamatório	Apto doação. Não fracionar plaquetas 3 dias
Fexofenadina	Antialérgicos	Apto 7 dias após a última dose
Finasterida	Inibidor da 5alfa redutase na HPB/ Teratogêncio	30 dias após a suspensão, em qualquer via de administração
Fluconazol	Antifúngico	Apto 7 dias após suspensão
Fluoxetina	Antidepressivo	Apto doação
Fumarato de Formoterol 6mcg + Budesonida	Corticóide inalatório	Asma sem crise doação. Asma com crise inaptidão de 3 meses após a última crise
Furosemida	Diurético	Apto doação

MA TRI

“Este documento tem validade somente no Sistema Documentador.

A cópia impressa é considerada não controlada.”



**TABELA DE TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE –
MEDICAMENTOS**

Anexo III TRI
Rev. 07
Página 4 de 8

Principais Medicamentos e sua correlação com a Doação de Sangue (continuação)

Medicamento	Classificação	Tempo de Inaptidão
Gabapentina	Anticonvulsivante/ Analgésico dor neuropática	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Haloperidol	Antipsicótico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Hidralazina	Vasodilatador direto	5 dias após suspensão
Hidroclorotiazida	Diurético	Apto doação
Hidrocortisona	Corticóide tópico	Só contraindica a doação se a doença de base o fizer
Isotretinoína	Retinóide/ Teratogênico	30 dias após suspensão
Ivermectina	Antiparasitário	Apto
Lamotrigina	Anticonvulsivante/ Antidepressivo	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Levocetirizina	Antialérgicos	Apto 7 dias pós a última dose
Lisdexanfetamina	Estimulante do SNC	48 horas após suspensão
Liraglutida	Hipoglicemiante para emagrecimento	7 dias após suspensão
Loratadina	Antialérgicos	Apto 7 dias pós a última dose
Losartana	Antagonista da Angiotensina II	Apto para doação
Lurasidona	Antipsicótico atípico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Maca peruana	Suplemento Vitamínico	Apto doação
Maleato de Timolol	Colírio para glaucoma	Por ser beta bloqueador, suspender por 48 horas
Mebendazol	Antiparasitário	Apto doação
Meloxicam	Antiinflamatório	Apto doação. Não fracionar plaquetas 3 dias
Mesalazina	Anti-inflamatório para tratamento de doenças inflamatórias do intestino	Ver motivo do uso. Se para Retocolite/ Doença de Crohn, inaptidão definitiva
Metildopa	Antihipertensivo de ação central	48 horas após suspensão
Metronidazol	Antiparasitário	Apto
Metoprolol	Beta bloqueador	48 horas após suspensão
Metotrexato	Citotóxico	30 dias após suspensão, avaliar motivo de uso

MA TRI

“Este documento tem validade somente no Sistema Documentador.

A cópia impressa é considerada não controlada.”



**TABELA DE TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE –
MEDICAMENTOS**

Anexo III TRI
Rev. 07
Página 5 de 8

Principais Medicamentos e sua correlação com a Doação de Sangue (continuação)

Medicamento	Classificação	Tempo de Inaptidão
Metoxisaleno	Tratamento repigmentante	Proceder conforme estágio do vitiligo e da psoríase severa
Miconazol	Antifúngico	7 dias após suspensão
Minoxidil	Vasodilatador direto	5 dias após suspensão Apto em uso tópico
Mirtazapina	Antidepressivo tetracíclico	Inapto por 48h
Modafinila	Psicoestimulante Tratamento da narcolepsia	Suspender por 48h, avaliar motivo de uso
Montelucaste	Para melhora da imunidade	Suspensão de 24 horas
Naltrexona	Anorexígeno	7 dias após suspensão
Nifedipina	Bloqueador canal de cálcio	Apto doação
Neozine	Antipsicótico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Nortriptilina	Antidepressivo tricíclico	Apto
Olanzapina	Antipsicótico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Oxalato de Escitalopram	Antidepressivo	Apto
Oxandrolona	Hormônio anabolizante	6 meses após suspensão
Oxprenolol	Beta bloqueador	48 horas após suspensão
Paliperidona	Antipsicótico atípico de liberação prolongada	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Paracetamol	Analgésico	Apto. Se febre, investigar a causa; de origem não determinada e curta duração, inaptar por 7 dias
PEPS	Profilaxia pós-exposição ao HIV	Se uso para ter relações sexuais com portador de HIV, 12 meses de inaptidão após a suspensão das relações
Piroxicam	Anti-inflamatório	Apto doação. Não fracionar plaquetas 3 dias
Polycarbofila cálcica	Laxante	Apto se sintomatologia aguda
Pramipexol	Para tratamento de Síndrome de pernas inquietas e Parkinson	Para Parkinson definitivo Para pernas inquietas suspensão de 48h
Prazosina	Bloqueador alfa adrenérgico	48 horas após suspensão

MA TRI

“Este documento tem validade somente no Sistema Documentador.

A cópia impressa é considerada não controlada.”



**TABELA DE TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE –
MEDICAMENTOS**

Anexo III TRI
Rev. 07
Página 6 de 8

Principais Medicamentos e sua correlação com a Doação de Sangue (continuação)

Medicamento	Classificação	Tempo de Inaptidão
Prednisona	Corticóide sistêmico	Depende da doença para a qual foi utilizado. Inaptidão mínima de 48 horas após a suspensão.
Pregabalina	Anticonvulsivante/Analgésico dor neuropática	7 dias após suspensão pelo médico assistente
PREPS	Profilaxia pré-exposição ao HIV	Se uso para ter relações sexuais com portador de HIV, 12 meses de inaptidão após suspensão das relações. Se usou como profilático, 3 meses.
Propiltiouracila	Antitireoideano de síntese	Inapto definitivo
Propranolol	Beta bloqueador	48 horas após suspensão
Quetiapina	Antipsicótico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Raloxifeno	Inibidor de células tumorais	Definitivo
Reserpina	Antihipertensivo de ação central	48 horas após suspensão
Risperidona	Antipsicótico	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Rivaroxabana	Anticoagulante	10 dias após suspensão, avaliar motivo de uso
Rituximabe	Imunossupressor: anticorpo monoclonal/ Imunobiológico	Inapto durante uso, avaliar motivo de uso, solicitar carta de médico assistente
Semaglutida	Hipoglicemiante para emagrecimento	7 dias após suspensão
Sertralina	Antidepressivo/ ansiolítico	Apto doação
Sibutramina	Anorexígeno	7 dias após suspensão
Sildenafil	Inibidor da fosfodiesterase 5/ Tratamento de disfunção erétil	7 dias após suspensão
Sinvastatina	Estatina	Não contraindicam a doação a menos que estejam sendo usados para tratamento de hiperlipidemia familiar
Somatropina	Hormônio de crescimento	Definitivo se de origem hipofisária não recombinante; apto se hormônio de crescimento recombinante

MA TRI

“Este documento tem validade somente no Sistema Documentador.

A cópia impressa é considerada não controlada.”



**TABELA DE TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE –
MEDICAMENTOS**

Anexo III TRI
Rev. 07
Página 7 de 8

Principais Medicamentos e sua correlação com a Doação de Sangue (continuação)

Medicamento	Classificação	Tempo de Inaptidão
Succinato de desvenlafaxina	Antidepressivo	Se a dose for elevada, de 3 ou mais comprimidos por dia, contraindica a doação
Succinato de metoprolol	Beta bloqueador	48 horas após suspensão
Tamoxifeno	Inibidor de células tumorais. Para tratamento do câncer de mama e osteoporose nas mulheres pós-menopausa	Inapto definitivo
Tansulosina	Bloqueador alfa-adrenérgico	Suspender por 48h
Tartarato de Brimonidina	Colírio para Glaucoma	Se crise aguda, inaptar. Tratamento em dose baixa libera a doação
Tadalafila	Inibidor da Fosfodiesterase 5/ tratamento de disfunção erétil	7 dias após suspensão
Tapazol	Tratamento do hipertireoidismo	Inapto definitivo
Telmisartana	Antihipertensivo	Apto
Terbinafina	Antifúngico	7 dias após término
Testosterona	Hormônio anabolizante	6 meses após término. Liberado uso de testosterona em gel na menopausa
Tiamina	Vitamina B1	Apto. Se para candidato pós bariátrica, ver protocolo
Ticlopidina	Antiplaquetário	14 dias após suspensão, avaliar motivo de uso
Topiramato	Anticonvulsivante/ Antidepressivo	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Tiamazol	Antitireoideano de síntese. Tratamento hipertireoidismo.	Inapto definitivo
Tramadol	Analgésico opióide de Ação central	Avaliar indicação do uso. Se para cirurgia ortopédica, 6 meses. Para dor aguda, verificar condição no dia da doação
Trastuzumabe	Anticorpo monoclonal humanizado	Inaptar durante uso da terapia; liberar com carta assinada pelo médico assistente

MA TRI

“Este documento tem validade somente no Sistema Documentador.

A cópia impressa é considerada não controlada.”



**TABELA DE TRIAGEM CLÍNICA DE DOADORES DE SANGUE –
MEDICAMENTOS**

Anexo III TRI
Rev. 07
Página 8 de 8

Principais Medicamentos e sua correlação com a Doação de Sangue (conclusão)

Medicamento	Classificação	Tempo de Inaptidão
Valerato de betametasona	Corticóide tópico	Só contraindicam a doação se a doença de base o fizer
Valproato de sódio	Anticonvulsivante/ Antidepressivo	7 dias após suspensão pelo médico assistente
Venlafaxina	Antidepressivo	Apto doação
Verapamil	Anti-hipertensivo	Apto. Verificar se tem indicação para problemas cardíacos
Tiamina	Vitamina	Apto
Xinafoato de salmeterol + Propionato de Fluticazona	Corticóide inalatório	Asma sem crise apto; Com crise inaptidão de 3 meses após a última crise
Zipazidona	Antipsicótico atípico	7 dias após suspensão pelo médico assistente

Drogas alucinógenas e/ou ilícitas

Substância	Via de administração	Tempo de Inaptidão
Anabolizantes	Via endovenosa	12 meses
Ayahuasca	Via oral	12 meses
Canabidiol	Via oral	12 horas
Cocaína	Via inalatória	12 meses
	Via endovenosa	Definitiva
Dietilamida do ácido lisérgico ou LSD	Via oral	12 meses
Maconha	Fumo ou ingestão	12 horas
Psilocibina	Ingestão	12 meses

Elaborado por	Verificado por	Aprovado por	Aprovado por
Assinado eletronicamente Magali Z. Covo	Assinado eletronicamente Renata Pavese	Assinado eletronicamente Sérvio Túlio Stingen	Assinado eletronicamente Claudia S. Lorenzato

**“Este documento tem validade somente no Sistema Documentador.
A cópia impressa é considerada não controlada.”**

MA TRI



ePROTOCOLO

ANEXOS 065/2024.

Documento: **AnexosTRIIIIIII.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Magali Zimmermann Covo (XXX.196.989-XX)** em 11/09/2024 14:06 Local: SESA/HEMEPAR/SERV, **Renata Pavese (XXX.742.109-XX)** em 12/09/2024 07:13, **Servio Tulio Stinghen (XXX.669.889-XX)** em 12/09/2024 08:54, **Claudia Santos Lorenzato (XXX.885.270-XX)** em 12/09/2024 09:18.

Inserido ao documento **933.166** por: **Dulce Gorski** em: 09/09/2024 15:09.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
f53a9e847afc28edf3053e88b2e06173.