



COQUELUCHE


PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS

Nº: 03 - 14/08/2024
Semana epidemiológica: 33




177
Casos confirmados


1 óbitos
Londrina




Faixa etária



Sintomas



Semana Epidemiológica



Regional de saúde	Município de residência	Total
1	Paranaguá	1
	Guaraqueçaba	2
	Matinhos	1
2	Curitiba	57
	Pinhais	10
	São José dos Pinhais	5
	Araucária	7
	Fazenda Rio Grande	3
	Lapa	3
	Colombo	3
	Campo Largo	11
	Almirante tamandaré	1
	Campina Grande do Sul	1
	Tijucas do sul	1
	Quitandinha	2
	ARAUCÁRIA	1
Piraquara	1	
3	Ivaí	12
	Ponta Grossa	16
4	Irati	3
	Inácio Martins	4
	Teixeira Soares	1
10	Anahy	1
	Corbelia	1
	Umuarama	1
15	Ivatuba	1
	Maringá	9
	Paicandu	1
17	Londrina	9
	Cambé	4
18	Abatiá	1
	Ibaiti	1
	tomazina	1
21	Imbau	1
Total geral		177



COQUELUCHE

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS

Nº: 03 - 14/08/2024
Semana epidemiológica: 33

Vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção contra a coqueluche.

Esquema de vacinação:



Crianças:

1 (uma) dose de vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida.

1 (uma) dose de vacina DTP aos 15 meses e 04 anos (reforço).



Gestantes:

- 1 (uma) dose de vacina dTpa a partir da 20^a até 36^a semana de gestação e puérperas (45 dias após o nascimento do bebê).

Mesmo com esquema completo ou reforço com dT ou dTpa, a gestante deverá receber sempre 1 (uma) dose de dTpa a cada gestação.



Também devem se vacinar com a dTpa:

- Todos os trabalhadores de saúde que atendem gestantes e crianças e que atuam nos serviços de saúde públicos e privados, ambulatorial e hospitalar, com atendimento em: Ginecologia e Obstetrícia; parto e pós-parto imediato, incluindo as casas de parto; unidade de terapia intensiva (UTI) e unidades de cuidados intensivos (UCI) neonatal convencional, UCI canguru; berçários (baixo, médio e alto risco); e pediatria.

- Profissionais que atuam como doula.

- Trabalhadores que atuam em berçários e creches, com atendimento de crianças até 4 anos de idade.