



COQUELUCHE



PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS

Nº: 01



Semana epidemiológica: 31

102
Casos confirmados

2 óbitos
1 Londrina
1 em investigação em Irati



Regional de Saúde	Município de Residência	Casos
1	Paranaguá,Paraná	1
	Guaraqueçaba,Paraná	1
2	Araucária,Paraná	5
	Campo Largo,Paraná	9
	Campo Magro,Paraná	1
	Colombo,Paraná	2
	Curitiba,Paraná	35
	Fazenda Rio Grande,Paraná	3
	Lapa,Paraná	2
	Pinhais,Paraná	6
	São José dos Pinhais,Paraná	3
	Almirante tamandaré,Paraná	1
Campina Grande do Sul,Paraná	1	
3	Ivaí,Paraná	12
	Ponta Grossa,Paraná	10
4	Irati,Paraná	2
15	Ivatuba,Paraná	1
17	Cambé,Paraná	1
	Londrina,Paraná	4
18	Abatiá,Paraná	1
19	Ibaiti,Paraná	1
Total		102





COQUELUCHE

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS CONFIRMADOS

Nº: 01

Semana epidemiológica: 31

Vacinação continua sendo a melhor forma de prevenção contra a coqueluche.

Esquema de vacinação:



Crianças:

1 (uma) dose de vacina pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de vida.

1 (uma) dose de vacina DTP aos 15 meses e 04 anos (reforço).



Gestantes:

- 1 (uma) dose de vacina dTpa a partir da 20^a até 36^a semana de gestação e puérperas (45 dias após o nascimento do bebê).

Mesmo com esquema completo ou reforço com dT ou dTpa, a gestante deverá receber sempre 1 (uma) dose de dTpa a cada gestação.



Também devem se vacinar com a dTpa:

- Todos os trabalhadores de saúde que atendem gestantes e crianças e que atuam nos serviços de saúde públicos e privados, ambulatorial e hospitalar, com atendimento em: ginecologia e obstetrícia; parto e pós-parto imediato, incluindo as casas de parto; unidade de terapia intensiva (UTI) e unidades de cuidados intensivos (UCI) neonatal convencional, UCI canguru; berçários (baixo, médio e alto risco); e pediatria.

- Trabalhadoras que atuam como doula.

- Trabalhadores que atuam em berçários e creches, com atendimento de crianças até 4 anos de idade.