


Near Miss Materno – Uma estratégia que salva vidas

CONTEXTUALIZAÇÃO DO MONITORAMENTO DO NEAR MISS MATERNO NO PARANÁ

DIVISÃO DE ATENÇÃO DA SAÚDE DA MULHER
DIRETORIA DE ATENÇÃO E VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Glaucia Osis Gonçalves



A investigação do near miss materno é considerada uma abordagem mais eficaz do que a morte materna para identificação de falhas na assistência ao parto e ao pré-natal e para o desenvolvimento de estratégias para redução efetiva das mortes maternas (OMS, 2011).





INFORMAÇÕES



MORTALIDADE MATERNA

EVENTO RARO E
INVESTIGAÇÃO
CRITERIOSA

DEPENDENTE DE
DOCUMENTAÇÃO

60 A 120 DIAS PARA RESULTADOS
DA INVESTIGAÇÃO

NEAR MISS MATERNO


30 X MAIS COMUM DO
QUE A MORTALIDADE
MATERNA

AÇÕES IMEDIATAS

15 MINUTOS PARA
IDENTIFICAÇÃO DAS
FRAGILIDADES DO CASO



A new conceptual framework for maternal morbidity



NOVO MARCO CONCEITUAL DA MORBIDADE MATERNA

Qualquer condição de saúde atribuída e/ou agravada pela gravidez e parto que tenha um impacto negativo no bem-estar da mulher (OMS, 2013).

POR QUE MONITORAR?

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o estudo da morbidade materna grave de forma complementar ao estudo do óbito materno, por apresentar **os mesmos determinantes e frequência mais elevada**, permitindo análises mais robustas (OMS, 2011)



**POR QUE
MONITORAR?**

+ CASOS

+ INFORMAÇÃO

**+ OPORTUNIDADES DE AÇÃO NA LINHA
DE CUIDADO**




**POR QUE
MONITORAR?**

**HÁ UMA MULHER E UM BEBÊ QUE
PRECISAM DE ATENÇÃO ESPECIAL**



LINHA DO TEMPO DO MONITORAMENTO DE NEAR MISS MATERNO - PARANÁ





MONITORAMENTO DE NEAR MISS MATERNO NO PARANÁ



Os casos são identificados por quadros graves ou gravíssimos de morbidades relacionadas à gestação, parto ou puerpério e/ou que ocorrem durante a gestação, parto, puerpério e após o puerpério, inclusive aqueles que possuem o óbito como desfecho.




Paciente
SEGURO



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA SAÚDE


OBJETIVOS DO MONITORAMENTO DE NEAR MISS MATERNO



Realizar a investigação do caso no NSP, na maternidade, e em outros setores hospitalares para identificar quais as intervenções necessárias para qualificação da assistência e melhoria dos fluxos e orientações.

Identificar as Três Demoras e atuar no aprimoramento da gestão regional e municipal da Linha de Cuidado, a fim de garantir o acesso, qualificar o atendimento na APS, AAE e AH e reduzir desfechos graves evitáveis.


Monitorar e avaliar os casos de near miss materno a nível regional e estadual para articular ações de prevenção e qualificação da Linha de Cuidado.



Pilares para Desenvolvimento da Alta Qualificada



LINHA DE CUIDADO
MATERNO INFANTIL
DO PARANÁ




CRITÉRIOS QUE AUXILIAM NA IDENTIFICAÇÃO DOS CASOS


Critérios clínicos	Critérios de manejo	Critérios laboratoriais	Causas externas	Saúde Mental
- Cianose aguda - Acidente vascular cerebral - Taquipneia - Bradipneia - Dispneia - Hipertensão - FC > 120 ou < 40 - Choque - Oligúria não responsiva a fluidos e/ou diuréticos - Distúrbios de coagulação - Paralisia total - Perda de consciência - Icterícia - Parada cardiorrespiratória - Sepses	- Anestesia Geral - Diálise por falência renal aguda - Histerectomia por infecção ou hemorragia - Intubação e ventilação - Laparotomia pós-parto - Ressuscitação cardiopulmonar - Sulfatação - Transferência emergencial para serviço de maior complexidade - Transferência para Unidade de Terapia Intensiva - Transfusão de hemocomponentes - Uso contínuo de drogas vasoativas - Outras cirurgias	- Bilirrubina > 100µmol/l ou 6,0 mg/dl - Creatinina ≥ 300µmol/l ou ≥ 3,5mg/dl - PaO2/FiO2 < 200 mmHg - Perda de consciência e presença de gluconato ou cetoácidos na urina - pH < 7,1 - Saturação de O2 < 90% por ≥60 minutos - Trombocitopenia (< 50.000 plaquetas)	- Politrauma - Lesões por arma de fogo com risco de morte - Lesões por armas brancas com risco de morte	- Tentativa de suicídio - Surto psicótico - Overdose de drogas - Intoxicação exógena
Diagnósticos mais frequentes relacionados ao near miss materno				
Eclampsia Pré-eclâmpsia grave Síndrome HELLP Rotura uterina Síndrome Respiratória Aguda Grave		Acidente Vascular Cerebral Inversão uterina Gestação ectópica rota Choque hipovolêmico por atonia uterina Sepses		



CICLO DE APRENDIZADO NMM




Notificações de near miss materno segundo Regional de Saúde- PR , 2023



231 Municípios
58%

Notificações de near miss materno segundo ano de notificação
abr.2018 a dez. 2023 Paraná





#SEUTRABALHOSALVAVIDAS





Obrigado

Divisão de Atenção à Saúde da Mulher

nearmisssmaterno@sesa.pr.gov.br

mulher@sesa.pr.gov.br

(41)3330-4538

